

HEAD START

PRIMEROS AUXILIOS PARA UNA EMERGENCIA DENTAL

En caso de un accidente a la lengua, labios, mejilla, o dientes:

Trate de calmar al niño. Todo incidente deberá ser tratado en una manera calmada; un niño lleno de pánico puede interferir con el tratamiento o causarse mas daño.

Llamar al padre.

Revisar para desangrado. Si el niño esta sangrando:

- a. Detener el sangrado aplicando presión a la área afectada.
- b. Aplicar hielo, envuelto en un paño limpio, para la hinchazón.

Si el diente es tumbado, fracturado, astillado, quebrado, o suelto:

- a. El personal deberá calmar al niño.
- b. Si la área herida esta sucia, limpiar suavemente.
- c. Aplicar compresas frías, en la área afectada, para controlar la hinchazón.
- d. Llamar al odontólogo (dentista) y describir la herida.
- e. Llevar al niño al odontólogo para tratamiento (No olvide el diente).
 1. No agarre la raíz del diente solamente por el lado de masticar-
 2. Si esta sucio, y enjuague el diente con agua.
 3. Regrese el diente al lugar en la encía de donde se cayo,
 4. Mantenga el diente húmedo a todo momento en
 - Leche
 - Agua fresca con un pocito de sal
 - Un botiquín de emergencia para preservación del diente
 - En la boca cerca de la mejilla
- f. Transportar al niño y el diente al odontólogo.

Si los dientes son aflojados en un accidente o empujados en la encía:

- a. No atente mover los dientes o quijada.
- b. Enjuague la boca del niño
- c. Llevar al niño al odontólogo inmediatamente
- a. Enjuague la boca del niño.

En caso de una herida a la lengua, mejilla o labios:

- a. Enjuague el área afectada.
- b. Aplicar hielo, envuelto en un paño limpio, para controlar la hinchazón.
- c. Llevar al niño al odontólogo o al medico si continua sangrando o si la herida es grande.

En caso de heridas a otros tejidos blandos, tal como el caso donde la lengua o los labios son pegados a un objeto y el tejido rompe:

- a. Detener el sangrado.
- b. Cubrir con gasa estéril y húmeda
- c. Llevar al niño al odontólogo o al medico.