


SEIZURE ACTION PLAN

Signs of a child who is having seizure activity:

- Sudden jerky movement of one body part
- Distortions in hearing or seeing
- Stomach discomfort
- Sudden sense of fear
- Consciousness may be impaired 5 – 15 seconds
- Dazed or confused
- Random walking
- Mumbling
- Head turning
- Pulling at clothing
- Staring – eyes may roll upwards
- Lip smacking
- Loses consciousness and falls
- Body becomes rigid
- Jerking and twitching



What you can do:


1. Stay CALM, you cannot stop the seizure; let it run its course.
2. Get the child to lie down, pad head area to avoid injury if head banging is present.
3. Do not restrain the child.
4. Loosen clothes around neck and waist.
5. Remove any nearby objects that might injure the child.
6. Gently try to place the child on his/her side so saliva/vomit can flow from the mouth. Do not try to insert objects in the mouth or grab the tongue.
7. After the seizure, allow the child to rest or even sleep.
8. Call 911 if seizure lasts more than 3 minutes.
9. Call the parents.
10. Refer to child's Individual Care Plan, if previously diagnosed with seizures for guidance.

Revised 1/5/2016

PLAN DE ACCIÓN PARA ATAQUES

Señales de que un niño está sufriendo un ataque parcial:

- Repentinos movimientos sacudidos de una parte del cuerpo
- Distorsión al oír o ver
- Molestias en el estómago
- Repentina sensación de miedo
- Conciencia puede ser afectada por 5-15 segundos
- Aturdido o confundido
- Aleatorio al caminar
- Balbucea
- Voltea la cabeza
- Jala su ropa
- Mirada fija-ojos pueden rodar hacia arriba
- Golpea los labios
- Pierde el conocimiento y se cae
- Endurece el cuerpo
- Sacudidos y Espasmos



Lo que usted puede hacer:

1. Manténgase CALMADO, usted no puede detener un ataque, déjelo terminar su curso.
2. Haga que el niño se acueste y acolchone su cabeza, para prevenir una lesión si se esta golpeando la cabeza.
3. No reprima al niño.
4. Afloje la ropa alrededor del cuello y cintura.
5. Quite de los alrededores cualquier objeto que pueda lastimar al niño.
6. Ponga al niño de lado con cuidado para que la saliva/vomito corra por la boca. No trate de ponerle objetos en la boca o detener la lengua.
7. Después del ataque, deje que el niño descanse o que duerma.
8. Llame al 911 si el ataque dura más de 3 minutos.
9. Llame a los padres.
10. Consulte el Plan de Cuidado Individual del niño, si previamente a sido diagnosticado con ataques para orientación.

Revised 1/5/2016